

Avertissements[®]

agricoles

Lorraine

Bulletin n° 6 du 15 mars 1989

Numérotation continue : n° 87

Grandes cultures

COLZA :

- Charançon de la tige : dernière minute.
- Mèligèthe : Intervenir en secteurs précoces.
- Cylindrosporiose : Pas de traitement.

CEREALES :

- Raccourcisseurs : Epi à 1 cm.
- Désherbage.
- A garder : Dépliant vert ITCF-SPV.

PROTEAGINEUX :

- A garder : Dépliant jaune FNAMS-ITCF-UNIP.

COLZA :

Les colzas sont entre le stade C2 (entre-nœuds visibles) et le stade D1 (boutons accolés).

- Charançon de la tige :

Le vol s'est généralisé dans toute la région entre le 5 et le 8 mars.

Intervenir rapidement si le traitement n'a pas encore été réalisé.

Cumul des captures du 5.3 au 14.3.89 :

	Chamblay (54)	Moncel-les-Lunéville (54)	Flin (54)	Port-sur-Seille (54)	Armaucourt (54)	Amance (54)	Chardogne (55)	Tréveray (55)	Ménil-sur-Saulx (55)	Pierrefite (55)	Houdelaircourt (55)	Nant-le-Grand (55)	Rollainville (88)	Rambervillers (88)	Ottange (57)
Charançon de la tige	1	6	6	1	79	22	15	26	74	1	32	9	4	5	2
Mèligèthe	1	17	2	0	0	0	54	1	54	0	0	1	0	0	0

Imprimerie de la Station de NANCY

Directeur-Gérant : D. VERBEKE

Publication Périodique

CPPAP No : 2011 AD

Abonnement annuel : 190 F

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

38, rue Sainte-Catherine
54043 NANCY CEDEX
Tél. 83 30 41 51



7142

- Méligèthe :

Dans les zones précoces, les premières captures de méligèthes sont observées dans les cuvettes.

Intervenir à partir du stade D1 si le seuil de 1 méligèthe par plante est atteint.

L'intervention contre le charançon de la tige aura une action sur les méligèthes.

- Cylindrosporiose :

Sur Jet Neuf, quelques rares symptômes sont visibles sur les anciennes feuilles.

Les traitements sont inutiles.

CEREALES :

Les blés et orges d'hiver, les plus précoces, atteignent ou dépassent le stade épi 1 cm. Les raccourcisseurs et certains désherbages doivent être raisonnés en fonction de ce stade.

- Raccourcisseurs sur blé :

C'est la période de décision d'une éventuelle application de raccourcisseur qui sera réservée aux :

- semis précoces disposant d'une forte fumure azotée
- variétés les plus sensibles au phénomène de verse (Feu Vert, Fidel, Camp Remy,...)
- parcelles les plus denses à la sortie de l'hiver.

Entre les stades épi 0,5 cm et épi 2 cm, on utilisera les produits à base de chlorméquat chlorure seul (C3) ou avec du chlorure de choline (C5). Au-delà de ces stades, on préférera CYCOCEL CL (adjonction de imazaquin) utilisable du stade tallage au stade 1 noeud.

Dans tous les cas, on attendra un temps poussant avec des températures supérieures à 10°.

- Désherbage :

La plupart des antigraminées ne doivent plus être utilisés après le stade épi 1 cm. Seules exceptions : PUMA, GRASP, ILLOXAN, MEGANET et SUFFIX.

Par contre, on peut appliquer les antidicotylédones dès que les risques de gel ou gros écarts de températures s'estompent. Il faut prendre en compte le développement des adventices (stade parfois avancé) pour le choix des produits et de leur dose d'application. La plupart exige des températures supérieures à 10° - 12° pour être pleinement efficaces. Cependant, des herbicides tels que ALLIE, BIFOX, EXEL, SCOOP peuvent être appliqués à partir de 5°.

Certains herbicides peuvent être mélangés avec un raccourcisseur. Se renseigner auprès de vos fournisseurs. Dans le cas contraire, attendre 8 jours entre 2 interventions (y compris azote).



